



ОРГАНИЧЕН БИОСТИМУЛАТОР

приложени при отглеждане на зеле, марули, спанак, салати

www.bio-chance.com / office@bio-chance.com / +359885665757

третиране преди засаждане

Подготовка на разтвор: 200 мл. концентрат се разтварят в 10л. вода

Накисване на семена: 10кг. семена се накисват в 10 л. готов разтвор, не по-рано от 2-3 дни* преди засяване за разсад.

*Усвояването на хранителните вещества от семената протича в период от 10-15 часа. За постигане на максимален ефект се препоръчва обработката да се извърши максимално близо преди засяването.

третиране по време на вегетация

Подготовка на разтвор: 400 мл. концентрат се разтварят в 50-300* л. вода.

* Количеството вода зависи от големината на дюзите за разпръскване/напояване.

Количество за единица площ: с 200-250 л разтвор се обработва 1 ха (10дка).

Начин на прилагане: листно и/или чрез капково напояване (фертигация).

Фази на прилагане: 1. 2-3 дни след засаждане на разсада.

2. При образуването на листна розетка и глава.

3. 10-12 дни след второто внасяне.

препоръки

1. За постигане на по-висок ефект и максимално усвояване на хранителните вещества от растенията, използвайте методите на прилагане на Био Шанс преди засяване, а по време на вегетация, редувайте храненето чрез листната и коренната система.

2. За постигане на максимален икономически ефект, планирайте дейностите по внасяне на Био Шанс, така че да съвпадат с дейностите по третиране с препарати за растителна защита. Така ще оптимизирате разходи за труд, горива, амортизации и др.